


ปัสสาวะ (Urine)

สิ่งส่งตรวจ ปัสสาวะ

ภาชนะบรรจุ ภาชนะปราศจากเชื้อ



วิธีเก็บ 1. Random urine

- เป็นปัสสาวะที่เก็บเวลาใดก็ได้
- ให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ โดยต้องเช็ดจากส่วนบนลงไปส่วนล่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากช่องทวารหนัก แล้วถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง
- เก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ประมาณ 2 ใน 3 ของภาชนะ
- ปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป
- ปิดฝาภาชนะให้สนิท
- ปริมาตร 10-15 mL
- รายการตรวจวิเคราะห์ Microscopy , Chemistry , Immunology

2. First morning urine

- เป็นปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนตอนเช้า

- ให้ผู้ป่วยทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ โดยต้องเช็ดจากส่วนบนลงในส่วนล่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากช่องทวารหนัก แล้วถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง
- เก็บปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ประมาณ 2 ใน 3 ของภาชนะ
- ปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป
- ปิดฝาภาชนะให้สนิท
- ปริมาตร 10-15 mL
- รายการตรวจวิเคราะห์ Microscopy